

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十一

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱忻

謄錄監生臣趙廷麒

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十一

明

周王朱櫛撰

嬰孩驚風門

慢驚風

附論

夫慢驚因病後或吐瀉脾虛胃損遍身冷口鼻氣出亦
冷手足瘈瘲昏睡露睛此無陽也惟括樓湯主之錢氏
曰無陽可用括樓湯內用括樓根白甘遂按本草括樓
根味苦寒無毒主心渴身熱甘遂味苦甘大寒有毒主

腹滿面目浮腫留飲宿食又曰驚急合涼瀉慢驚合溫
補錢氏云急驚涼瀉慢驚溫補今同括樓湯寒毒之藥
又無溫補為佐首尾亦無補助兼主對不親如此治之
怪也經曰實實虛虛損不足益有餘有如此者醫殺之
慢驚虛病寒毒之藥甚戾人正合難經虛虛之論乃錢
氏之非也愚常治此病以神寶丹寬筋湯治之多愈錢
氏方脉議論優長甚為可取其間如治慢驚法用括樓
湯陰癰壞病內亦用此方錢豈不知括樓湯反為害也

觀其智識必不如是儻有此說但取其所長畧其所短
庶幾不悞耳○徐仲秀子三歲七月中因傷乳食嘔吐
數次而後作瀉召一醫視之三日不退加之眼露後因
顛陷氣粗面白形青虛煩腹痛忽發驚風進退召愚視
曰此子雖是慢驚法當斷乳三日頻與稀粥服藥可安
主人曰小兒以乳妳為本豈可即遽然捨乳也荅曰舟
非水不能行然波濤沸湧則有覆舟之患兒非乳不養
然吐瀉過傷則有傾人之患波濤非自生其所以生者

風鼓不平之勢作之也吐瀉非自生其所以生者風冷乳食之傷引之也風息則水勢平乳少則吐瀉安善行舟者不懼波濤而懼舟之不固善為醫者不懼吐瀉而懼乳之不節蓋乳猶水也水能載舟亦能覆舟此之謂也始因傷乳為病若以所傷之乳乳之如以酒解醉轉加昏憤固能節乳使藥速驗也主人乃聽用神寶丹續命湯安神膏日各三服頻與稀粥至夜驚再不潮翌日暖哺尚困是中脘有食脾胃有風主人曰何以知也荅曰

暖者是有食困者是有風當用宣風散汁用下紫九
子令微利再用神寶丹安神膏琥珀散日各二服調治
三日時與止妳至五日全安主人曰慢驚風何敢快生
答曰病雖至困形青而不昏肚痛而手足常溫驚搐無
痰喘氣而微熱是胃氣未脫經曰胃者水穀之海主稟
四時故皆以胃氣為本此子病雖至困胃氣尚未脫可
以復生也○蘇氏子半年自生下時復觀乳一月吐而
身熱召愚視曰心者精神之本清虛不欲昏不可昧昏

昧則氣濁氣濁則神亂神亂則血脉不榮今者血脉俱虛精神離散不可治主人曰何便不治荅曰緣見兒目鮮而顙腫面白而唇青兼遶口鼻人中肉內隱出黑色是精神散失素問云得神者昌失神者亡設或苟安猶若輕漚浮水暫駐目前亦豈宜久微燭乘風其不亡者何待主人大怒後易數醫果驚而卒○大便青臍冷也或初出微黃良久則青者亦然也靈秘云瀉下如藍澱胎中受積驚蓋惟心主驚心驚則膽怯膽者與肝為表

裏也膽怯則肝冷肝傳脾受邪故大便初出微黃脾之色也良久後青肝之本色肝熱則外發目赤肝冷則內作便青又有不因驚而得此證者蓋稟胎氣怯弱內受風寒故也有便青夾白膿稠粘如涎者亦是腸寒久冷令小兒面白形青腹痛驚啼失治則變陰癰也○凡慢驚風候若是急驚傳來而尚陽證其陽即虧不必回陽又不待治陽只可截風而調胃均平陰陽可冷可熱可緩可急是也若直便為服附子硫黃之屬使陽歸陽又

是急驚學者理宜知之既治陽證傳作陰證即與服保命丹三二服兼前牛黃清心丸子其有四證具八候稍緩陰癇者即可與服之若已傳過八候不作四證尚在者只宜與服定命飲子若脚手冰冷者乃四逆候方可回陽次第合眼者即傳作慢脾風候寒而驚風痰涎壅盛搐搦不止不可下者宜與五靈脂丸其痰涎壅盛口角垂者白薑丸功效驚風搐搦身體雖煖風痰不化宜服天南星丸○嬰孩所受此等證候無他疑者只將下

項用藥無不甦省切不可延久其陽易脫陰氣漸盛藥力不及使人難治又不可一向連併投藥每次一二服了須審察證候緩急有無傳變稍覺寬定其藥放慢或勢漸緊宜以次第緊急藥與服不可執滯一藥又不便換湯餌連併與之所謂察其輕重審其進止而後已○慢驚若是急傳來是知前人不曾截風定搐陽脫而傳陰陰重陽虧其風與熱常流注經絡又有曾服大寒涼之藥過多又有下積取瀉致作又有臟腑虛寒洞瀉而

為其所受多端○理慢驚風當知陰廕之說其證屬陰
臟寒氣虛尚或泄瀉不止其驚正作多因無識之人一
向治驚更不理瀉藥用寒涼投之令氣愈虛洩瀉不止
陰證愈作驚搐愈增若用止瀉藥稍熱八候復加四證
不退慢驚雖曰難治蓋醫亦不曾究竟病作加進深為
重害○慢驚當察知所視為要眼睛昏定為重竄視為
重四肢厥冷為重睛定不眨為重雖眨不左右顧為重
汗出如流亦重口面忽作黯黯色至重感風搐搦慢驚

眼在半開半合之間者乃知陰氣漸盛傳入臟間陽氣已虧脾經屬陰次第入脾故言慢脾風候○醫慢驚與急驚風候自是不同未可一向下定搐藥急驚謂闕竅不通故以腦子麝香等藥通利定其搐搦慢風陰重陽虧諸經已虛不宜通關又涼其臟易作慢脾風○醫慢驚不可爭攻急驚陽癇稍易理慢驚陰證最難服藥已愈而尚虛乏未省三五日之間者有之俗謂過街候發無定論不可輕易妄投攻擊之劑則前功俱喪○慢驚所

治之理須究問原因所發若是急驚傳陰為慢驚者乃
癇所作陰癇也當察陽子為重即陽脫而陰盛小兒有
長幼之別臟腑有虛實之分有瀉三五次便成風候乃
由虛之甚也或二三日洩方成風候或有五七日瀉不
止而成風候暴瀉成風猶可速治蓋回陽調中補氣之
為易若久瀉漸傳成風候者為虛為乏故難療理○嬰
孩小兒洞泄成風以補藥治之者宜用附子臟寒洞泄
或因服藥下積取瀉成風宜以溫脾壯氣藥調之宜服

觀音金蝎散有服寒涼藥成風者下藥太涼致令臟腑
先寒遇發藥吐瀉即傳成風候以助氣醒脾藥溫之即
王氏大惺惺丸大喝起散與服之効若手足冷面陽宜
木附湯効陽癇傳作陰癇候急驚傳作慢驚風候以截
風藥定搐藥若在前三者慢驚候便以截風往往未為
當蓋由病自虛乏得之所以云調補之理○慢驚之候
其意在慢治急驚之候其意在急何也蓋急無過因熱
生風作驚跌撲作驚他物觸之作驚驚熱傳極即變生

風搖擗等候皆熱所乘若順證依法下之諸候自息慢驚所作不常當宜省察用意子細所療至為難以故宜消息之為慢也不可愴惶恐懼非失治躊躇疑貳之為慢也又曰慢驚無爭攻蓋所療至為難事○嬰孩所患急驚慢驚慢脾三者皆由風痰所作以漸傳及未有初得病而便慢脾者或急驚傳來或吐瀉而得或久痢氣虛脫而得傷寒表裏既虛傳入陰證亦成慢候久嗽成癰亦傳慢驚候霍亂吐痢亦傳慢候脾困久睡亦傳慢

候吐血亦傳慢候虫積衝心亦傳慢候肝風筋急大小
便閉心虛煩躁煩渴引飲肚腹疔痛睡裏咬牙日夜汗
出走馬疳急諸般丹毒龍纏腰膀肱吊疔卵腫莖曲四
體浮腫以上諸般證亦皆傳慢候有如此者其所患
諸疾皆能傳作慢驚乃傳作慢脾脾氣既絕胃氣已盡
無可得而治療也○嬰兒五臟易冷易熱易虛易實醫
方並不治腑受病曰臟不病耳曰非也小兒在腑有疾
自息愈者有之在臟不可不治臟者陰屬腑者陽屬謂

小兒先陰而後陽又曰小兒乃純陽之氣在腑則順在臟則逆故前賢皆理其臟未言治腑也又腎一臟常主虛不可攻療若有腎病但清心肺緣心與腎即既濟也肺與腎乃子母也無與腎藥及諸補藥若治腎臟即他病發生故戒止不可療湯氏云吐瀉總生便惡心胃虛脾弱汗相侵舌赤唇緋隻眼閉頭搖髮豎起如針膈悶氣粗兩脇動口生瘡白命難任未生此證宜先治有瘡胃閉命須沉未發慢脾先要困睡中吐舌更搖頭吐

妳作腥生氣息額頭千顆汗珠流睡裏多驚驚哭起面黃脉細最堪憂腥脾助胃成切效傷妳依前命也休凡有此疾宜暫斷乳控令胃乾飢甚當用藥令藥乳母釀其乳與之十救一二矣○全嬰簡易方云驚風似是非若同而異受證非一治法不同此病之惑人也醫者當首辨明而治之宿州陳氏田曰驚風二證驚自驚急驚慢脾也風自風五臟中風也當分別治之世言熱極生風而不知風寒暑濕之氣亦能生風錢仲陽云傷

風傷寒傷食麻豆變兼等候亦能搐所謂斷搐者是也
陳氏曰醫者每見小兒發搐不辨是否驚風用蜈蚣腦
麝牛黃巴粉等寒涼毒劑多致天傷或成慢候蓋真氣
者元陽也如用藥性溫則固養元陽用藥性冷則敗傷
真氣宜用溫涼之劑則無過與不及楊氏曰驚風暴烈
惟蜈蚣能截能擒貴乎藥病相當辨認的是驚風之證
方可用之或一字半字而止或傷風等證假搐不可妄
投中毒非淺或有誤焉急以桑白皮蚯蚓為解錢氏湯氏

胡氏楊氏辨云傷風傷寒熱盛生驚必有傷風傷寒之證但牙關不緊麻豆搐乃熱乘於心心火炎上故目睛上竄乃痘證欲出之狀必中指冷耳後紅綉乃四臟之證但無痰潮食積發搐必有面黃吐利夜熱晝涼等證變兼微搐但唇上白珠生蛔厥多似慢驚但唇口紫吐清涎癰者四肢柔軟發而時醒痙瘓一身強直終日不醒痙則舉身強直痙則手足冰冷剛痙有汗柔痙無汗中風口眼喎斜必有五臟中風之證天吊或啼或哭狀似

鬼祟頭目仰視如魚上釣內吊偃倮返張唇黑陰腫眼
有紅筋斑血客忤物忤中惡面變易五色狀似驚癇但
目不上視○楊氏曰慢驚無熱乃虛熱也當用藥以溫之
又曰終經吐痢便是慢驚由虛使之須用溫中扶裏抑
陰助陽用理中湯加木香錢氏云夏月脾胃伏熱當解
暑毒不可便曰回陽楊氏曰方傳慢驚尚有八候竄視
反引搐搦掣顫也但昏沉者不可回陽宜調胃截驚可
涼可熱均平陰陽而已用全蝎觀音散又曰若陽虛陰

盛病已傳過無搖掣反視之證昏沉者用四君子湯加附子三分之重者對加又曰手足冰冷方可回陽用附子理中湯慢驚下痰用蘇合香丸白丸子又曰若眼半合半開手足不冷不可回陽其證尚在慢驚用調中湯參苓白朮散或用實脾散楊氏截驚用太乙保生丹或用奪命丹柳氏曰凡吐瀉氣虛體弱者調胃用實脾散便服奪命丹以截其驚

方

實脾散 治脾胃虛冷吐痢不止不進乳食慢驚脾等

證及治痘證下痢不能收靨

人參 白朮 白茯苓 縮砂仁 丁香

各五錢

二錢

木香

炮二錢

麥芽 石蓮肉 麴餅 陳皮

去白

山藥 良薑

油炒

青皮

去白

冬瓜仁

各五錢

肉豆

寇

三箇煨

薏苡

薑炒三錢

扁豆

薑炒三錢

香附子

炒去毛三錢

分

甘草

炙三錢

陳米

一撮炒

右為細末常服棗湯調或米湯燒鹽調服吐痢脾胃

虛弱加消積飲同服慢驚脾手足厥冷加附子理中湯同服下回陽丹冷吐痢加附子訶子肉慢驚慢脾研奪命丹同服

蘆薈散 治小兒慢驚風胸膈痰涎咽喉壅塞身體壯熱筋脉拘急時或發渴

蘆薈

研

龍骨

雄黃

研

麝香

研各
半分

胡黃連

青黛

研

木香

丁香

牛黃

研

天竺黃

熊

膽

研

乾蝎

炒

膩粉

研

丹砂

研

犀角

鎔

附子

炮製去皮臍去

人參

沉香

各一分

右搗研為散每服半錢薄荷湯調下

牛黃丸

治小兒慢驚風及取風涎積聚

牛黃

細研

甘草

炙微赤剉

陳橘皮

湯浸去白紙焙

黃連

去

天南星

炮製

白附子

炮製

附子

炮製去皮臍去

半夏

洗

七遍去滑

乾蝎

微炒

犀角屑

硃砂

細研

硃砂

細研

各一分

水銀

半兩燒棗一處別研星盡

金箔

二十片細研

硫

黃

半兩細研

麝香

半分細研

巴豆

十枚去心皮殼別研壓去油

右為末都研令均以麪糊和丸如黍米大每服以甘

草薄荷湯下三丸至五丸

烏犀散

出聖惠方

治小兒慢驚風或發即戴眼向上手足

搐搦

烏犀角屑

一分

獨角仙

三枚微炙去翅足

驢胎耳

一分燒灰

雀兒飯甕

五枚

乾蝎

一分燒灰

白殭蠶

一分微炒

硃砂

一分細研

雄黃

一分細研

丁香

一分

蠶紙

一張出子者燒灰

麝香

一分細研

牛黃

一分細研

羌活

半兩

青黛

一分細研

天竺黃

細研一分

右為散都研令勻不計時候以溫水調下半錢量兒

大小加減服之

龍腦散

出聖惠方

治小兒慢驚風心胸痰涎上攻咽喉如

呀身體壯熱筋脉拘急或時發歇抽掣

龍腦

半分細研

雄黃

一分細研

麝香

一分細研

盧會

一分細研

胡黃連

一分

青黛

一分細研

木香

一分

丁香

一分

牛

黃

一分細研

天竺黃

一分細研

熊膽

一分

犀角屑

一分

乾蝎

一分生用

膩粉

一分

硃砂

一分細研

右為散同研令勻不計時候薄荷湯調半錢服之量

兒大小加減

回魂煎 治小兒慢驚風

天南星

一枚重二錢者燒地坑子令赤用醋潑下天南星以瓦片合定勿透氣去皮臍取二

錢

白附子

三枚生用

烏蛇

四寸用酒浸去皮骨炙

蜈蚣

一條

酒炙

棘剛子

三十枚

乾蝎

全者七枚炒

丹砂

水銀

沙子

兩皂子大

膩粉

各一分

麝香

犀角末

乳香

各一錢

金箔

三片共沙
子一處研

牛黃

龍腦

各半錢研

右為搗研勻細用石腦油為膏旋丸如豌豆大每服
一丸薄荷湯化下

天竺黃丸

出聖
惠方

治小兒慢驚風搐搦

天竺黃

一分
細研

牛黃

一分
細研

麝香

一分
細研

龍腦

半分

細研

木香

半分

丁香

半分

雄蠶蛾

十四枚

雄黃

半分

細研

胡黃連

半分

硃砂

一分
細研

金箔

十四片
細研

膩

粉分半

熊膽

半分

蘆薈

半分
細研

犀角屑

半分

右為末都研令勻鍊蜜和丸如菉豆大不計時候以

粥飲下三丸量大小加減服之

水銀丸

出聖惠方

治小兒慢驚風面青口噤吐涎脚冷身

熱頻頻搐搦

水銀

半兩入黑鉛半兩結為沙子細研

天南星

一分炮製

鉛霜

一分

細研

硃砂

一分細研

雄黃

一分細研

天竺黃

一分細研

犀

角屑

一分

麝香

半分細研

牛黃

半分細研

龍腦

半分細研

馬牙硝

一分細研

金箔

三十片細研

白附子

一分炮裂

乾

蝎

一分
微炒

膩粉

半分

右為末入諸藥同研令勻用雀兒飯甕內虫十枚鍊蜜同研和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯化破三丸量兒大小加減服之

通聖餅子

出御
藥院

治小兒慢驚風癇涎多咽喉不利手

足搐搦

天麻

使君子

去
皮

白殭蠶

炒

白附子

炮

南

星

炮各
一分

乳香

青黛

蝎稍

炒

膩粉

水粉

各一錢

黑鉛

半錢與水銀結沙

無食子

一對去皮

麝香

腦子

各半錢

右為細末麪糊為丸如梧桐子大捏作餅子每服以餅子用薄荷湯化下食後臨睡服之臨時加減

歸魂丸

治小兒慢驚風搖頭閉目

金箔

十五片研

丹砂

研

膩粉

研

牛黃

研

青黛

研

白殭蠶

炒

蟬殼

去土

白附子

炮

乾蝎

全者

炒

防風

去蘆

犀角

鎊

天南星

炮各一分

天麻

半兩

棘剛子

十二枚

右為末鍊蜜和丸如梧子大每服一丸薄荷湯下妳

食後臨睡服

北金丸

出聖惠方

治小兒慢驚風胸膈多涎迷悶口噤發

歇搐搦縱睡多驚

牛黃

一錢細研

麝香

一錢細研

烏犀角屑

一分

硃砂

一分

天南星

一分細研炮裂

烏蛇肉

一分炙令黃

羚羊角屑

一分

乾蝎

一分微炒

雄黃

一錢細研

水銀

一分

金箔

二十

一 片 銀箔 二十一片已上三 雀兒飯甕 二十枚內

右為末都研令勻鍊了蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷汁下三丸量兒大小加減服之

觀音散 出危氏方 治胃氣不和脾困下瀉過多不思飲食

乳食不化精神昏慢四肢困冷

人參 白朮 紙煨 扁豆 炒各二錢半 白茯苓 酸棗

仁 去皮蚌粉炒 甘草 炙各半兩 藿香 枳殼 去瓢各一錢半

紫蘇葉 少許 木香 不見火 石蓮肉 去心 嫩黃耆 各半

兩

右為末每服一錢烏梅湯冬瓜子仁陳米調皆可

保命丸

出聖惠方

治小兒慢驚風及天癆驚熱

牛黃

細研

乾蝎

微炒

白殭蠶

微炒

蟬殼

微炒

天麻

白附子

炮製

犀角屑

天南星

炮製

青黛

細研

硃

砂

細研

麝香

細研

天漿子

麴炒令黃去殼已上各一分

蟾酥

半分細研

右為末用獺猪膽汁和丸如菉豆大不計時候用薄

荷湯下三丸又以水化二丸滴入鼻中令連連嚏後

再服更在臨時量兒大小加減

丁香丸

出聖惠方

治小兒慢驚風兼有疳氣壯熱及乳哺

減少

母丁香

錢半

胡黃連

半

蘆薈

半

雄黃

半

硃砂

一分

牛黃

半

蝎稍

一分

麝香

一分

青黛

一分

膩粉

半

白附子

一分

天竺黃

一分

細研

鉛霜

半

右為末取五月稷子尖和丸如菉豆大不計時候以
粥飲下三丸量兒大小以意加減

犀角丸

出聖惠方

治小兒慢驚風搐搦煩熱

犀角屑

一分

蟬殼

二七枚
微炙

烏蛇

半兩酒浸去
皮骨炙令黃

牛黃

一分
細研

青黛

一分
細研

天漿子

二七枚
炒去殼

地龍

一分

蟾酥

半錢鐵器
上焙過研

硃砂

半兩細研
水飛過

防風

半兩去
蘆頭

蠶紙

一張
燒灰

麝香

一分
細研

右為末入研了藥都令勻鍊蜜和丸如黍子大每服

以溫荊芥湯下兩丸先研一丸着新汲水化滴在鼻
中得嚏為効量兒大小加減服之大人風癇取活蠅
蝦虫不拘多少研如泥生麪和丸如雞頭實大捏作
餅子煏灰火煨每嚼一餅子煎荊芥湯下前藥十九
更量大小虛實加減

聚寶丹

出直指方

傳慢可用

人參 茯神 琥珀 天麻 直殭蠶炒 防風

南星 白附子 全蝎 烏蛇肉酒浸焙 硃砂

各一錢

半錢

麝香

少許

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服一丸菖蒲湯調

下

調中湯 治急驚和胃氣止吐瀉溫中正氣

人參 白茯苓 川白薤 白朮 石蓮肉 龍

腦 麝香 蘆薈 熊膽 膩粉 胡黃連

各半
錢研

使君子

青黛

研各
一錢

香墨

半兩
研

右為擣羅胡黃連使君子為末餘研極細滴水丸

如梧桐子大每服二丸煎金銀薄荷湯摩下經宿便
愈

龍腦丸

出聖惠方

治小兒慢驚風壯熱手足拘急

龍腦

一分

麝香

一分細研

硃砂

一分細研

白芥子

一分微炒

阿魏

一錢麝煨

藿香

天麻

炮

扁豆

薑製

木香

炮

陳皮

去白

粉草

半夏麴

各等分

右為末薑棗湯調服

交泰丹

出全嬰方

治兒因吐瀉之後變成慢驚累服熱藥

上熱下冷涎鳴氣粗服藥雖多止在膈上不入中此藥治虛陽潮上發搐來去

黑鉛一兩 硫黃 水銀各三錢 天漿子二十箇 蜈

蚣一條 硃砂 附子炮去皮 鐵液粉各二錢 全蝎

蛇肉酒浸去骨 麝香半錢 槐柳枝各二寸細判

炭火上煨別將槐柳枝各一莖不住手打旋入
硃黃冷次入水銀煎為沙子為度地上出火氣

右為末薑汁煮糊丸如菜豆大三歲三丸米飲湯送下食前如病熱速鍊蜜和丸如雞頭大一丸薄荷湯

化下本法作丸子鎮墜

鈎藤飲

出全
嬰方

治小兒因吐瀉脾虛多因脾弱變成慢

驚

鈎藤

蟬殼

人參

麻黃

去節

防己

一方用防風不用防

已

殭蠶

炒

天麻

蝎尾

去毒炒
各半兩

甘草

川

芎

各一分

麝香

一錢

附子

炮一分

右為末三歲一錢水半盞生薑三片煎三分食前一

方無生薑煎

觀音金蝎散

出和劑方

治小兒因吐而傳慢驚外感風冷

內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸漸羸弱大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能養脾胃進美飲食

黃耆

一分

人參

一分

木香

一分

炙甘草

石蓮肉

炒

扁豆

炒

白茯苓

各一錢

白芷

全蝎

防

風

羌活

各一錢

天麻

二錢

右為末每服半錢或一錢棗子半箇水一小盞煎至半

蓋與服不拘時候慢脾宜尤服之此觀音散漢東王
氏所著調理嬰孩清神固氣補虛益脉開胃止吐醇
乎醇善之者耶所因用藥截風者何正于危急之除
却作兩餌投之先與生胃氣次服截風定癇如此療
理不惟迂曲致緩又且未能藥于脾胃之間悟其至
理兩劑一行或加白丸子未半和之乃盡其妙一方
有神麴

再生丸 治小兒虛風慢驚搐搦項筋緊強手足逆冷

腰背拘急

蜈蚣

一條酒浸
一宿炙

乾蝎

全者七
枚炒

蠶蛾

十枚
炒

白

殭蠶

直者
炒

丹砂

研各
一錢

天南星

炮

白附子

炮

麝香當門子

各一
枚

薄荷心

七
枚

龍腦

研

水銀

錫結炒子
各一錢

棘剛子

二十
枚炒

右為細末研勻以石腦油和劑油單裏每服旋作一

丸如黍米大冷水化下須發前服必効後服服睡脾

散

睡脾散 治小兒慢驚風

桑螵蛸

四枚

乾薄荷葉

乾蝎

全者炒

人參 乾

山芋

天南星

炮

半夏

生薑汁浸透切焙各一分

右為細散每服半錢麝香粟米飲調下

罷搐煎 治慢驚

丹砂

研

水銀

天南星

炮

膩粉

研

薄荷

白附子

炮

乾蝎

全者炒各一分

右為細末用石腦油和成煎每服一大豆許薄荷湯

化下

牛黃散

出聖惠方

治小兒慢驚風壯熱發歇搐搦

牛黃

一分

麝香

一分

雄黃

一分

熊膽

半分

蘆薈

一分

硃砂

半兩細研水飛過

天竺黃

一分

夜明砂

一分微炒

犀

角末

一分

胡黃連

末一分

乾蝎

一分半末

右件都研細令為散不計時候以薄荷湯調半錢服之量兒大小以意加減兼用少許吹入鼻中良

牛黃丸

出聖惠方

治小兒慢驚風發歇不止

牛黃

半兩
細研

天竺黃

半兩
細研

犀角屑

半兩

芎藭

一分

人參

一分
去蘆頭

龍齒

一分
細研

白茯苓

一分

麝香

錢一

龍腦

半錢
細研

胡黃連

半兩

丁香

一分

鈎藤

一分

右為末用水蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下三丸

量兒大小以意加減

青黛丸

出聖
惠方

治小兒慢驚風體熱多涎發歇搐搦

青黛

一分
細研

牛黃

一分
細研

硃砂

半兩
水飛過

蝸牛

一分
炒

烏蛇

一兩
酒浸去骨炙令黃

乾蝎

二七枚
微炒

胡

黃連

一分

白殭蠶

微炒一分

白附子

炮裂一分

麝香

一錢

研

蟾酥

三片如柳葉
大鐵上培焦

狗膽

二枚
取汁

右為末入狗膽汁與糯米飯和丸如黃米大一二歲

兒薄荷湯下三丸日三服四歲兒服五丸

如聖丸

出聖
惠方

治小兒慢驚風精神昏迷痰涎逆上咽

喉中作聲有時口噤發歇搐搦

牛黃

二錢
細研

犀角屑

一分

硃砂

一分
細研

雄黃

一分
研

麝香

一錢
研

人參

一分去
蘆頭

白茯苓

一分

龍齒

一分

細研

鈎藤

一分

羌活

一分

蟬殼

二七枚
微炒

甘草

半

炙微
赤剉

右為末研了藥同研令勻以棗肉和丸如菉豆大不
計時候犀角湯下三丸量兒以意加減

烏犀丸

出聖
惠方

治小兒慢驚風搐搦吐涎

烏犀角屑

一分

羚羊角屑

一分

胡黃連

一分

麝香

一分

研

蘆薈

一分

雄黃

一分

硃砂

一分

丁香

一分

牛黃

一分

龍腦

一分

天南星

一分

兩用酒
升煮盡

為度切
破熬乾

半夏

一分漿水一升煮
盡為度切破熬成

右為末入研了藥令勻內銚子火上化石腦油和丸
如菴豆大不計時候以溫酒化下一丸金銀薄荷湯
下亦得

木香湯

出直
指方

治慢驚慢脾得効

南星

濕紙
煨

白附子

焙

天麻

木香

橘皮

白

茯苓

石蓮肉

各一分

黃耆

白朮

石菖蒲

甘草

炙各
半分

右為粗末每服半錢薑棗煎服

安神膏

出全
嬰方

治小兒心虛多驚恍惚不寧腹痛便青

并吐瀉之後欲生慢驚

硃砂

二錢

全蝎 人參 白茯苓 天麻 附子

炮

川芎

乳香

各一錢

麝香

一字

坯子

半錢

又

一方加琥珀

右為末鍊蜜和丸如雞頭大三歲一丸薄荷湯下

醒脾散

出醫方
集成

甘草 白朮 人參 橘紅 白茯苓 全蝎已上

各半 半夏一分 木香一分 白附子四個 南

星三枚 倉陳米三百枚

右為細末每服一錢水半盞生薑二片棗子半枚煎至二分逐旋服之不可一頓服之必吐

續命湯

一名寬筋湯
出全嬰方

治小兒吐瀉之後因虛生風瘈

瘈神昏涎盛不利應是慢驚虛風並宜服之

麻黃

去節炮
半兩

防風

一分
半

芍藥

附子

生

人

參 川芎 白朮 防已 黃芩 桂枝

各一兩

一分

一分 甘草 各半兩

右為粗末三歲一錢水半盞薑三片棗子十枚煎三分去渣食前加麝香蝎尤妙有汗者去麻黃

全蝎觀音散 治外感風邪內傷脾胃以致脾虛吐瀉俱下急宜服以防慢候

全蝎 二十個 天麻 防風 羌活 川白

去蘆 各五錢

芷 黃耆 甘草 赤茯苓 人參

蜜炙

各錢二

去皮 五錢

去蘆
二分

縮砂仁五錢

扁豆二錢
薑製

右為末冬瓜仁棗湯調下

香餅子

出直指方

治慢驚初傳涎潮昏搐

麻黃

纏匝慢火炙乾又
蘸薑汁炙凡三次

花蛇肉

烏蛇肉

并酒
浸焙

直殭蠶

炒各一分

白附子

焙

人參

天麻

防風

各一錢

乳香

半錢

麝香

一字

全蝎

十四個
蘆汁浸

右為末用南星末煮糊丸如梧桐子大捏作餅子日乾每服一二餅子薑湯調下

天麻丸

出聖惠方

治小兒慢驚風熱筋脉跳掣精神昏亂

風涎不利宜服

天麻

一兩

乾蝎

生一兩

白僵蠶

生用一兩

防風

去蘆一兩

甘草

一分炙微赤

白附子

生用一兩

雄黃

一分

牛黃

一分

麝香

一分

右為末研入硃砂等四味令勻鍊蜜和丸如菉豆大
不計時候薄荷湯化破三丸服之看兒大小臨時加
減服之

蝎稍膏

一名蜈蚣膏
出醫方抄選

治慢驚久不瘥尤宜服之

直桑螵蛸

七箇

天麻

半兩

麻黃

一兩
去節

蝎稍

一分

白殭蠶

一分揀直者微炒已
上掛羅為細末次用

硃砂

半兩
水飛

乳香

一分 硼砂

錢一

麝香

錢一

龍腦

半兩

右都一處拌勻鍊蜜和成膏如芡實大用金箔裹之
每服一粒煎荊芥薄荷湯化下

天竺黃散 治小兒慢驚風久不瘥

天竺黃 人參 胡黃連 使君子

炮各
一分

藿香

半
分

半夏

三枚薑汁浸炒

丹砂

研

麝香

研各半錢

蝎稍

炒

甘草

炙各一分

右將八味為細散入丹砂麝香研勻每服一字匕冷

蜜調下熟水亦得量兒大小加減服之

羌活煎 治小兒慢驚風內外俱虛

羌活

去蘆頭

防風

去蘆

桂

去蘆皮

獨活

去蘆頭

人

參

各一分

白附子

半兩

乾蝎

全者炒

白殭蠶

炒各一錢

水銀

硫黃

各二錢研

右擣羅八味次鎔硫黃成汁次入水銀為沙子放冷
細研入衆藥末用棗肉蜜和成煎每服一大豆許煎
防風湯化下紫參人參湯亦得一方去白殭蠶加茯
苓一分

蟾蜍散

出直指方

治慢驚身熱痰滯

大乾蟾

一個酥塗炙黃

直殭蠶

蟬殼

蝎尾

各焙

白

附子

微炮

五靈脂

蘆薈

琥珀

各一分

硃砂

一錢

麝香

半錢

右為末每服半錢防風煎湯調下

清脾飲

出全
嬰方

治小兒傳慢驚尚有陽証或因吐瀉多

困不醒欲生風候

人參 白附子

南星

炮

半夏

炮七
次

全蝎

殭蠶

白朮

川芎

羌活

甘草

已上各
等分

右咬咀三歲一錢水半盞生薑三片冬瓜子仁二十

七粒煎三分去渣無時溫服

萬靈丹

出聖
惠方

治小兒慢驚風多涎腹脹潮熱發渴搐

搗

牛黃

一錢
細研

麝香

半錢
細研

熊膽

半錢
細研

膩粉

半錢
細研

乾蝎

五枚
微炒

硃砂

一分
細研

巴豆

三枚
去皮心研

木香

半錢

白附子

三枚
炮製

蟬殼

七枚
微炒

右先擣羅四味為細末次入六味同研勻鍊蜜為丸
如黍米大每服三丸煎薄荷荊芥湯下量兒大小加
減服之

龍腦丸

出聖
惠方

治小兒慢驚風及疳熱

龍腦

一分
細研

丁香

一分
末

硃砂

一分
細研

麝香

一分
細研

末

蟾酥

半分
研入

牛黃

一分
細研

犀角末

一分

雄黃

一分
細研

天竺黃

一分
細研

右都研令勻用猪膽一枚別入雄黃一分入在猪膽
內繫却以漿水一碗入銚子內煮盡取出與藥末和
丸如黍米大三歲兒以溫水下一丸子研破搐入鼻
內得嚏為効

硃砂丸

出聖
惠方

治小兒慢驚風四肢拘急心胸痰滯身

體壯熱

硃砂

半兩細研
水飛過

牛黃

一分
細研

天麻

半兩

麝香

半兩

細研

天南星

半兩
炮裂

乾蝎

半兩
微炒

白附子

半兩
炮製

乾薑

半兩
炮製

巴豆

半兩
去心皮
研壓去油

右為末鍊蜜和丸如黍米大每服以妳汁下一丸荊芥湯下亦得量大小以意加減

犀角散

出聖
惠方

治小兒慢驚風心神煩熱多驚體瘦四

肢抽掣

犀角屑

一分

天麻

一分

白附子

一分
炮製

乾蝎

一分
微炒

硃砂

半兩
細研
水飛過

膩粉

半兩

麝香

一分

牛黃

一分
細研

晚蠶蛾

半兩

右為細散不計時候煎龍膽湯放溫調下半錢量兒
大小以意加減

助胃膏

出直
指方

治慢風吐瀉不進乳食

人參

白朮

各二錢

丁香

檀香

舶

上茴香

炒

白豆蔻

木香

甘草

各一錢

右為末粟米糊和丸如梧桐子大每一丸陳米飲下
脾困不醒用冬瓜子仁煎湯

一醉膏

出全
嬰方

治小兒慢驚潮搐神昏不得睡亦治大

病後及擒捉風涎流滯手足不隨

乳香

天麻

各二錢

麝香

一字

安息香

全蝎

蜈蚣

各二錢

附子

炮

麻黃

去節

酸棗仁

炒去皮
各四錢

右為末法酒同蜜熬熟為丸如雞頭大三歲一丸酒
化下盡醉灌之得睡不驚効

醒脾散

出活幼口議

治嬰孩小兒吐瀉不止痰作驚風脾

困昏沉默默不食

木香

炮一錢

全蝎

炒半錢

人參

一分

白茯苓

一錢

白朮

炮一錢

甘草

炙一錢

白殭蠶

炮一錢

白附子

炮一錢

右為末每服半錢大者加服水半盞棗子同煎五七沸通口無時服此良方最為穩善小兒吐瀉脾虛作驚疾神困氣弱沉沉默默皆脾經虛乏已甚風痰併

聚故爾不醒宜多與服仍加既濟丹及觀音全蝎散
俱良其痰復有引掣搐搦未退者即不可與驚風丸
散及腦麝蜜寒涼等藥其證愈惡其候愈盛不惟驚
風未退且痰熱之盛兒即作傳變傳即慢脾變即陰
逆慢脾猶載方藥尚可理之陰逆之候何可醫治陰
逆者陰謂陽氣欲絕逆謂受證不順不順欲絕但增
吁嗟使無所措手醒脾良方豈可隱匿

辰砂蠟稍膏

出百一
選方

辰砂

研

青黛

研

天竺黃

研

全蝎

五箇

天麻

一分

麝香

一字研

龍膽

半錢研

白附子

一錢半生用

金箔

二十葉

右研勻以生薑蜜和膏每服一皂子或兩皂子量兒大小加減用生薑或薄荷湯研化下

保生丹

出直指方

治慢驚尚有陽證

全蠍

青者十箇

防風

各二錢

白附子

炮

僵蠶

蟬退

牛膽南星

琥珀

硃砂

一錢

麝香

半錢

右為末粟米糊丸如梧桐子大薄荷湯吞下一方金箔為衣凡吐痢慢驚慢脾緣小兒脾胃虛弱乳食不可過飽再傷脾胃

防風丸

出危氏方

治慢驚不省手足微動眼上視昏睡

天麻

防風

人參

各一錢

全蠍

去毒七箇

殭蠶

炒斷

絲

粉草

各五錢

硃砂

雄黃

各三錢半

麝香

半錢

右為末煉蜜和丸小指大人參湯化下一丸不以時候冬瓜仁湯尤妙

琥珀丸 治慢風

琥珀

研

犀角屑

各一錢

真珠末

二錢

天南星

酒浸

麝炒二錢

牛黃

研

龍腦

麝香

研各一字

丹砂

研一分

乾蠍

七枚全者妙

右為末鍊蜜丸如雞頭實大每服一九煎菊花湯下
摩化龍腦丸 治小兒慢驚風潮發

水銀

一分

金箔

二十片

銀箔

二十片已上三味細研為沙予

右為末都研令勻以鍊蜜和丸如黍米大每服以溫

酒下三丸量兒大小以意加減

保生丹

出聖惠方

治小兒慢驚風多涎昏悶或口噤搐搦

發歇無時

硃砂

半兩細研水飛過

天麻

半兩

白附子

半兩炮製

白殭

蠶

半兩微炒

乾薑

一分炮製

乾蠍

半兩頭尾全者微炒

牛黃

一分細研

麝香

一分細研

右為末入硃砂等同研令勻鍊蜜和丸如麻子大不計時候以金銀湯下三丸量兒大小以意加減

治慢驚風

試問慢驚如何治大槩元來同吐痢附子豆蔻與
南星加入勝紅為妙劑勝紅如何有加減法製南
星黃牛膽冬子仁蠟茶調醒脾散風陽氣斂

右為細末薄荷湯下加乾薑

硃砂丸

出聖惠方

治小兒慢驚風搐搦發歇不定喉中涎

聚時作聲漸覺虛羸不乳食眼澁多睡驚癇

硃砂

半兩細研水飛過

雄黃

半兩細研

牛黃

一分細研

龍腦

一分
細研

乾蠟

半兩
微炒

膩粉

一分

水銀

半兩以鉛一
分結為沙子

硃砂

一分
細研

右研水銀沙子令細即與諸藥同研入棗肉和丸如

菴豆大百日以上兒以薄荷湯下一丸一歲兒二丸

一二日取下粘涎惡物為効此藥慢善不瀉但是虛

困瘦瘁宜與服之神驗

天竺黃散

出聖
惠方

治小兒慢驚風體熱搐搦

天竺黃

半兩
細研

川大黃

三分剉
碎微炒

天麻

半兩

栢枝

半兩
微炒

蟬殼

一分
微炒

白附子

一分
炮製

鬱金

半兩

乾

蠍

一分
微炒

右為細散不計時候以乳汁調下一字量兒大小加減服之

天麻丸 治小兒慢驚神識昏塞時發時省手足搐搦目睛直視

天麻

白殭蠶

乾蠍

去土
炒

白附子

各二錢

牛

黃

研

丹砂

研

麝香

研各半錢

雄黃

研一錢

右為末鍊蜜和丸如雞頭實大每服一丸薄荷湯化下量兒大小加減服之

釀乳法

出醫方集成

治吐瀉成慢驚睡多驚哭几面黃脉

細難治慢脾虛風宜暫斷乳令兒飢甚以釀乳法乳之

人參 木香 藿香 沉香 橘皮 神麴 麥

蘖 丁香

減半餘各等分

右㕮咀每服四錢水一碗薑十片紫蘇十葉棗子三

枚砂瓶內煮至半碗乳母食後捏去妳汁盡方澄服
半盞服即仰臥霎時令藥入乳之絡次令兒喫數口
不過飽此乃良法也嘔定一日了急宜截風宜服八
仙散後醒脾散一方用縮砂仁散虛甚加白薑痢不
止加訶子吐不止加薑汁吐後生驚歌曰吐乳從來
胃氣實妳滿胃中生吐逆吐多遍身風氣生驚邪
本是從斯得吐定無過腦後溫吐出妳來無變色先
與定吐後祛風如此醫流無費力

丙丁膏

一名神麴餅
子出金嬰方

治小兒吐瀉之後精神倦怠多

睡不省不思飲食四肢逆冷啼如鴉聲咽喉不利丙

日作麴丁日合藥

方見本門一
切驚風類

烏沉湯

出直指方

治慢驚驅風助胃

天麻

二錢

人參 真川烏

生 全蠍

焙

南星

炮

沉香 木香

各一錢

甘草

炒半錢

右剉散每服三字薑三片慢火煎取其半與之

青金膏

一名青龍膏
子出金嬰方

治吐痢生風變成慢驚尤宜服

之兼治急慢驚風身體強涎潮昏塞

烏蛇稍

一分酒浸
一宿焙乾

乾蠍稍

一分

天麻

一分

白附

子

一分

川附

一枚
炮

青黛

一分

麝香

錢一

天竺黃

錢一

右先將烏蛇稍肉等五味先擣羅為細末次入青黛等三味拌鍊蜜成膏如皂子大煎人參薄荷湯化下

鈎藤飲

一名蟬殼飲出
衛生家寶方

治小兒吐痢後藏虛慢驚平

定時瘈瘲多睡眼上視乳食不進

鈎藤鈎子

分三

川芎

白殭蠶

去嘴炒

蟬退

去足各半

兩

蛇皮

甘草

炙各一分

蜣螂

炙五枚去頭翅足

附子

炮去皮臍

右為末每服二錢水一盞煎至六分去渣溫分三服

急驚有執證去附子

緩驚紅餅子 治慢驚馬

山藥 茯苓 乳香 赤石脂 白朮 全蠍

甘草

已上各等分

右為細末鍊蜜為丸如餅子一方用五靈脂

天漿子丸 治小兒慢驚風發歇不定

天漿

二七枚 麩炒
令黃去殼

蟬殼

二七枚
微炒

棘刺

三七枚
微炒

蠶紙

一張
燒灰

防風

一兩去
蘆頭

硃砂

一分
細研

麝香

一分
細研

右為末都研令勻鍊蜜和丸如麻子大一二歲每五
丸連夜三服量兒大小以意加減

七聖丹 治小兒慢驚風面青口噤四肢拘急喉內多

涎發歇搐搦眼目上視一名延生丹一名七聖散

硃砂

一分
極細研

牛黃

一分
極細研

麝香

一分
極細研

蠍尾

七枚
微炒

白殭蠶

七枚
微炒

羌活

一分

天南星

半兩

細研

右為末用棗和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯下

三丸看兒大小加減服之

白殭蠶散

出聖
惠方

治小兒慢驚壯熱四肢拘急痰涎壅

滯發歇不定

白殭蠶

一分
微炒

蟬殼

一分
微炒

蠍尾

白附子

一分
炮製

劉

蘆薈

一分
細研

五靈脂

一分

蟾頭

一枚
炙令焦酥

硃砂

一分
細研

牛黃

半分
細研

壁宮子

三枚
炙令黃

麝

香

半分
細研

雄黃

一分
細研

右為細散入研了藥令勻不計時候以薄荷湯調下

半錢看兒大小加減服之

靈脂丸

出直
指方

治慢驚痰盛搐搦

五靈脂

香潤
者

白附子

畧
炮

木香

直殭蠶

炒各
一分

全蠍

焙半
分

硃砂

一
錢

天南星

濕紙
半兩

右為末米醋煮生半夏糊為丸如麻子大每服三丸
薑湯送下

辰砂丸

出全
嬰方

治小兒慢驚風搐搦及天癇癇病

蝎尾

二十
一箇

牛黃 麝香

各半
兩

附子

二箇
尖

雄

黃

少
許

硃砂

一
錢

巴豆

七箇好者燈上燒
令焦黃去皮用肉

右為末寒食日蒸餅為丸如小豆大一歲一丸荆芥

湯下衣被蓋少時汗出如天癇搐搦開口不得者便

用蒜入鹽同搗塗藥一丸在兒後心上以前蒜作餅

蓋之以帛係定後更服一九化破入麝香少許以前
湯下覺口內蒜氣渾身汗出者大効須是端午日合

忌雞犬婦人見

神寶丹

出全
嬰方

治小兒或先吐後瀉或先瀉後吐或瀉

吐俱發之後變成慢驚者

附子

米泔水一盞薑半兩研浸三日
次用蛤粉炒製去皮臍半兩

羌活 硃

砂 蝎尾

半兩

南星

兩箇各一兩去皮臍剉蒸子
片酸漿一碗薑一分片子

煮酸漿水浸去薑焙乾
半兩牛膽中南星尤妙

麝香

乳香

各一分

右為末煉蜜和丸如雞頭大三歲者半丸薄荷湯化
下小可驚瀉便青腹痛與少許服立効如小兒只吐
不瀉發急驚以紫丸重瀉五七行後與此藥並食前
或以珍珠丸亦得

紫霜散 治小兒慢驚風潮發搐搦項筋緊強

白花蛇

酒浸一宿去
皮骨一兩

鐵粉

半兩
研

丹砂

研

白

附子

炮

蝎梢

各一分

麝香

一錢
研

右為細末散每服半錢薄荷湯調下不拘時

星香全蝎散

出直指方

治慢驚風昏迷痰搐

方見本門一切驚風類

神寶既濟丹

出活幼口議

治小兒分陰陽平冷熱定吐瀉

豁痰涎或已作風候不可下者

硫黃

燄硝

陳橘皮

青橘皮

並去白

五靈脂

川省良

半夏麴

炙炒皆可

右等分為末硫硝二味和研令勻一處用磁器鎔汁傾出候冷研細旋入諸藥和勻秫米粉水煮糊為丸如小豆大每服二歲兒服三十丸大者加之並溫飯

飲下空心食前此藥均分陰陽二氣多服有益○陰陽二氣不均冷熱相制驚風已作搐搦不定或陽虧陰盛或陰虧陽盛或驚風未散吐瀉不止或嘔逆或發喘或脚手漸冷或眼目欲合或服涼藥太多或虛損不足或沉沉默默不省或恍恍惚惚生驚但胃氣未脫速與服之若是危急不待作丸子可只以溫飯飲調與服以愈為度若脚手冰冷者服之立溫未止者服之立止雖慢驚慢脾風候宜與服仍加薄荷湯

尤良

竹瀝膏

出全
嬰方

治小兒久患脾虛發搐慢驚潮歇

附子

炮一
錢

厚朴

薑汁浸一
宿焙乾

白朮

蜜炒各
一分

麻

黃

去節炒
半錢

犀角屑

一錢
焙乾

全蝎

二十七箇薄荷
汁浸一夕焙乾

右為末竹瀝為丸如雞頭大三歲一丸薄荷湯化下

無時

治慢驚

出楊氏
家藏方

赤脚蜈蚣

一條頭尾全
者酒塗炙

白殭蠶

七箇
炒

辰砂

一字

別研

麝香

少許
別研

青州白丸子

三十粒

全蝎

七箇
頭尾

全者各用生薄荷葉裹定
外以麻線係定火上炙

右為末將人參麥門冬湯調下急驚加腦子牛黃各

少許煎金銀薄荷湯調服之一方水化蒸餅為丸○

續經驗治法前件藥如俱用不効危困可憂須診衝

脉未絕在兩足面間當灸百會取前後髮際兩耳尖

折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊不審

有雙頂者又有毛旋不正者庸庸之輩只循習舊本

誤人多矣灸後即當控涎用青州白丸子末再煎如
稀糊一般入蜜須冷熱得所調奪命散服之良久涎
下細研靈砂米飲調和旋抹口中如證漸退而風
堅服八仙散昏困服醒脾散常令減乳妳子服釀乳
藥如此調理無不更生間有稟受不堅本氣素弱五
行脩短雖有神聖工巧靈丹妙劑不能奪其造化此
乃曉然之理學者不可不審若涎已壅膈但聞喉中
如鋸藥不能入又不可控當別法療之然須搐鼻噴嚏

得出次服奪命散或免再潮

溫白丸

出全
嬰方

治小兒脾胃氣虛困頓洩瀉冷疳洞利

及吐瀉之後或病久變成慢驚身冷瘳癰

天麻

半兩

殭蠶

去嘴

白附子

全蝎

南星

炮七
次各

一分

右為末寒食麪煮糊為丸如小豆大三歲三十丸薑

湯下食前如作散薑煎尤妙漸加服一方加附子一

分

五靈脂丸

出全
嬰方

治小兒因吐瀉之後變為慢驚發歇

不定

蟬蛻

一分

附子

炮去皮臍一
作白附子

五靈脂

南星

薑汁

浸一
宿焙

乾蝎

各半
兩

麝香

一字一方
不用麝香

右為末釀醋一盞藥末半兩同熬成膏次入餘藥并麝香和為丸如雞頭大三歲一丸乳汁化下金銀薄荷湯服亦得鼻上汗出為効

定命飲子

出活幼
口議

治嬰孩小兒吐瀉脾胃虛弱發作

慢驚風候搐搦不已醫工截風不止取痰不下散熱不退即驚不去其証欲傳慢脾風候一名天麻散亦治急驚風

半夏

揀羊眼者半分

天麻

一分

甘草

炙

白茯苓

白

木

老生薑

各二錢

右用水一盞磁器內煮令水乾將半夏天麻白木茯苓切焙為細末每服半錢或一錢生薑棗子湯調與服無時一方用半夏七錢天麻二錢半甘草等四味

各三錢一方有木香無天麻○此方健脾化痰去風
散熱功效如神醫工少有知用初學之士只知有腦
麝香麝等方用之俗夫便言好藥殊不知腦麝乃醫
家出不得已用之其物通關竅開閉塞踈理利骨
節其藥屬陰能化於陽只有急驚宜用慢驚慢脾傷
寒等患悉宜禁止其或疳痢藥用之虛者亦禁惟有
痙症癲癇宜用定命飲子屢經效驗野老處定此方
功同造化深智高明往往欽服痰搦連併脉息怯不

敢頓下者宜與靈芝丸若手足逆冷兼進回陽之劑行
醫用藥至於此等証候乃主治之權變也

乾蝎天麻散

出御藥院

治小兒慢驚風

乾蝎

全者十枚炒

蔓陀羅

七朶重一字

天麻

二錢半

乳

香

研

天南星

炮

丹砂

研各一分

右為細末每服半錢薄荷湯調下不拘時

快脾湯

指出方

治慢驚脾困不食和胃祛風

天南星

一箇剉如碁子塊生薑一兩切川厚朴一兩剉碎水三升同煮令南星透去薑朴只

用南星
切焙

白茯苓

兩半

木香

人參

天麻

各二錢半

全蝎

七箇
焙

右為末每服半錢甘草生薑煎湯調下

桃紅散

治小兒慢驚風手足瘈瘲神情如醉

天南星

炮

烏頭

炮製去
皮臍

白附子

炮

天麻

各半

兩

乾蝎

微炒二
十一枚

丹砂

研一
分

右為細散每服一字或半字入牛黃龍腦各少許煎

麻黃湯調下日三

珍珠丸

出聖惠方

治小兒慢驚風墜涎

珍珠

牛黃

丹砂

雄黃

膩粉

各一分研

右為合研勻細用粳米飯和丸如黃米大一二歲兒每服三丸薄荷湯下日三更量兒大小加減

辰砂膏

出活幼口議

治嬰孩小兒慢驚風傳脾風傳慢候

有冷痰在膈潮作不散此疾虛久不可頓下其兒搗緩昏困至重者

大黑附子

一箇八九錢者去皮頂上刻一孔入粉霜硃砂各半錢內在孔中用附末塞燒

性 灰存

天南星

炮半兩

蠍稍

羌活

各一分

硃砂

半兩
飛過

右為末以硃砂和勻鍊蜜為丸雞頭子大每服一丸
至兩丸金銀薄荷入酒三五滴點化與服一方麝香
薄荷湯下○此三方皆用黑附子直不可執謂性熱
兒在幼小礙與服之兒患脾風脚手冷者有微有暴
審其輕重輕即用湯盛即以丸重即以膏服之皆効
須候手足煖陽氣回即為之快矣既以溫煖更以醒

脾正謂藥兼服除是慢驚傳入慢脾候方可與服之
硫黃其功甚速又且逐風化痰醒脾開胃溫煖臟腑
補益腸胃奪命回陽省活危困至良至驗切不可倉
皇妄投丸散或爾太過不及之時則致咎於後萬宜
詳審不至誣誕故也

天南星丸

出直指方

治慢驚痰壅惟身熱者可服

南星

一斤每重一兩上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮並虛軟處令淨用法酒浸一宿用桑

柴蒸不住添熱湯滿釜令甑內氣猛便不住洒酒常令藥潤七得時滿取出用銅刀子切開一個大

者嚼少許不麻舌為熱未即
再炊候熱用銅刀切細焙乾

麝香

研

丁香

各一

兩

龍腦

研一兩半

辰砂

別研水飛二兩用一半為衣

右為細末入研藥勺鍊蜜并酒丸硃砂為衣每服一

豆許生薑煎調下

蠍附散

出危氏方

回陽氣豁風痰

全蠍

七箇

附子

炮二錢

南星

炮

白附子

炮

木

香

各一錢

右為末每服半錢薑四片慢火熟煎旋服

黃連丸

出聖
惠方

治小兒慢驚風心胸痰涎腹內壅悶或

搐搦

黃連

一分

青黛

一分

麝香

一分

硃砂

一分
細研

巴

豆霜

半兩

右都研令細用猪膽汁和丸如黍米大每服以薄荷湯下三丸量兒大小加減服之

乾蠍丸

治小兒慢驚風

乾蠍

五枚全
者炒

細辛

去苗
葉

乳香

研各
一分

青黛

研

白附子

炮各半兩

右為細散每服半錢匕煎冬瓜子湯調下不拘時

丁香丸 治小兒慢驚風吐逆不定胃虛生涎多驚饒睡

丁香

一分為末

半夏

三枚湯洗十遍焙乾為末

蠟稍

四十九枚炒為末

水銀

鉛各一分二味結砂子

右合研勻細用熟棗肉和丸如菉豆大每服五丸至七丸量兒大小加減並用荊芥薄荷湯下大人虛風

痰涎丸如梧桐子大一服七丸至十丸

麝香散

出聖惠方

治小兒慢驚風及天癰

麝香

一分
細研

膩粉

一分

牛黃

一分
細研

乾蠍

一分

白

附子

一分
炮製

右為細散不計時候以薄荷汁調下一字量兒大小

加減服之

硃砂散

出聖惠方

治小兒一臘後月內忽中慢驚風及無

辜之候

硃砂

一分
細研

牛黃

一分
細研

麝香

一分
細研

乾蠍

十四
枚微

炒

雀兒飯甕

一十枚麴炒
令黃去壳

右細研為散不計時候以乳汁調下半錢薄荷湯調

下亦得更量兒大小以意加減

迴生丹

出聖
惠方

治小兒慢驚風痰涎壅悶發歇搐搦

天麻

一分

白附子

一分
炮製

白殭蠶

一分
微炒

桃膠

一分

天南星

一分
炮製

右為末以爛飯和丸如黍米大每服以溫薄荷酒下

三九量兒大小加減服之

返魂丹

出聖惠方

治小兒慢驚風及天癆夜啼

蝙蝠

一枚去翼腸肚炙焦黃

人中白

一分細研

乾蝎

一分微炒

麝

香

一分細研

右為細散人中白等同研令勻煉蜜和丸如菉豆大薄荷汁研下三九大小加減

小黑膏

一名小黑散出鮑氏方

治小兒傷寒發搐慢驚脾風鼻

流清涕及傷寒風癰

南星

三箇燒
存性

川烏

三箇燒
存性

玄參

四錢

大薄荷

葉

四錢

右為末鍊蜜和丸如龍眼大每服一丸煎薄荷湯化
下○蘇沈良方與此同星烏各一箇薄荷玄參各五
錢一方作散每服一豆許蜜和葱白用研細白湯調
下如筋脉緩急乳香同葱白煎湯下

羌活丸

治小兒慢驚虛困痰涎不利

羌活

去蘆頭
一兩

白殭蠶

炒半兩二
味搗末

硫黃

水銀

各半分二味
結砂子研

右為合研勻細鍊蜜和丸如豌豆大四五歲每服二
丸三歲以下一丸煎金銀荊芥薄荷湯化下

理中湯

人參

去蘆

白朮

白薑

炮

甘草

炙各等分

右為末薑棗煎服手足厥冷加附子炮回陽

犀角散

出活幼口議

治嬰孩小兒因吐瀉神困力乏欲傳

作慢驚風候

犀角

鎊一錢

白朮

二錢水
煮過

甘草

炙半錢

陳皮

舊者

良去白
一分

右為末每服一錢水一中盞金銀薄荷同煎三五沸
通口無時服○此方治小兒吐瀉神困力乏欲發慢
脾風候正謂救急不可令緩若已傳受即風即熱即
驚交相攻作神散不定上竄搐搦悉由脾虛之所致
也脾經既虛次第胃虛其藥白朮陳皮預理脾胃犀
角退熱去風熱既不作痰無由生醒脾壯胃風何得

有漸見甦省兼與醒脾散及既濟丹相間服一向取
愈為良其方全不用逐風化痰之藥者蓋是證候欲
作慢驚所以未宜先投緊藥故用此方調之和劑一
正是其脾氣得無傳變不勞療理簡徑微沙稽首智
者作之施功利益而已

療痰方

出湯氏
寶書

川烏尖

附子尖

各七箇生
去皮用

蝎稍

七箇

石綠

少許

右為末和勻用軟雞翎蘸藥入喉中逐旋惹出頻用

帕子拭之

定吐截風回陽

出湯氏寶書

金液丹

青州白丸子

五靈脂

一錢

青皮

未一錢

右和劑蒸餅糊丸如黍米大米湯送下大小加減服之

丁附湯

出危氏方

治吐瀉虛脫成慢驚風困而不醒

用大附子生或炮製去皮臍剉散每服一錢水一盞生薑五片丁香五粒煎五分更量大小與之急無丁

香亦可屢收奇効

豆卷散 治小兒慢驚多用性大溫及熱藥治之有驚

未退而別生熱証者有病愈而熱証者有反為急驚

者甚多當問得病幾日又何以得之曾以何藥治之

可用解毒無有不効

方見本門急慢驚風類

蟬蝎散

出直指方

治方傳慢驚及驚風積熱

全蝎

七箇去尾尖

蟬壳

二十箇

甘草

二錢半炙

天南星

一個
爐香

右為末每服半錢生薑棗煎服積熱加薄荷煎

四聖散

出直指方

治慢驚痰滯虛熱若有竄視搐搦證壯

以少許冊管吹入鼻中

全蝎

七箇

直殭蠶

十四箇

天南星

七錢半

真川烏

三錢三分

并生用

右將南星為末水調作餅裏蠶川烏外用溫紙重炮
慢火中煨令赤色頓地土上一伏時為末每服煎金
銀湯點好茶清少許調下

黑附湯

出直指方

治慢脾風盛四肢厥冷

方見本門慢脾風類

天南星煎丸

出聖惠方

治小兒慢驚風

天南星

一兩細剉水二盞微火熬至半盞去渣重熬成膏

白附子

半兩炮製

天麻

一兩

乾蝎

一分炒

右擣羅三味為末入天南星膏內和丸如菉豆大三歲兒每服二丸薄荷湯下五六歲兒三丸日再服更量兒大小加減不拘時一方無乾蝎

又方

出聖惠方

雀兒飯甕

三枚有蟲者

白殭蠶

三枚微炒

乾蝎

三枚微炒

右為細末每服以麻黃湯調下一字日三服汗出為効三歲已上即加之

玉液丹

出聖惠方

治小兒慢驚風及天癰熱疳心驚悸等

白附子

一分生用

赤箭

一分

白殭蠶

一分生用

膩粉

一分

右以三味擣羅為末入膩粉同研令勻鍊蜜和丸如麻子大二歲兒每服以熟水下三丸三四歲每服五丸日二三服量兒大小以意加減

天漿子散

出御藥院

治小兒慢驚風

天漿子

有蟲去

白殭蠶

炒

乾蝎

各二十箇炒

右為細末每服一字煎麻黃湯調下或薄荷湯下無時日三隨兒大小加減之大有効

南星飲

出危氏方

宣利過多脾困眼慢涎盛四肢不舉不

思飲食

大南星

三箇炒赤令熟

冬瓜子仁

白扁豆

各一兩

右為末每服一錢薑二片防風少許煎湯調服

川烏散

出直指方

驅風回陽

方見本門
慢脾風類

附硫丸

一名小續命
丸出活幼口議

治嬰孩小兒慢脾風四肢厥冷

方見本門
慢脾風類

南附湯

出危氏方

治洩瀉虛脫生風名慢驚風及因服冷

藥多者

南星

生附子二

錢

全蝎

五箇
去毒

右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎五分量大小
旋服

麻黃散 治小兒慢驚風因轉瀉虛極多睡善欠醫所

不能療

麻黃

七節以兒
中指節比

薄荷

全者
七葉

乾蝎

全者
一枚

右各炒黃色合搗研為細散每服半錢溫薄荷水調

下更量兒大小加減服後略以衣被蓋之汗出立瘥

麝香餅子 治小兒慢驚風涎塞咽喉服利藥過度

麝香

研

膩粉

各三錢
七分

定粉

一錢

右研令勻細以香墨研濃汁和丸捏如豆大每服

一餅薄荷湯化下

治小兒慢驚風

生菜 薄荷 荊芥

右各等分擣滴汁數點入口淬繫於臍中

乳香丸 治小兒慢驚風心神悶亂煩懊不安筋脉拘急胃虛蠱動反折啼叫

乳香

蓋子內鎔過研半錢

胡粉

一分

右合研勻細用白頸蚯蚓生捏去土爛研和就為丸

如麻子大每服七丸至十五丸煎葱白湯下更量兒
大小加減

治小兒慢驚百藥不効者及驚風手足搐搦涎潮上壅
一名烏頭丸
出醫方集成

大川烏頭

去皮臍
生用

全蝎

各等
分

右咬咀每服半兩水兩大碗生薑五十片煎至三四
分去渣逐旋以藥注灌之

董陸香丸

出御
藥院

治小兒虛風慢驚潮搐瘈瘲安魂益

心氣

血竭

兩半

乳香

二錢半

右同研細末用火上炙極乾時滴水丸如酸棗大每服一九薄荷酒化下不計時候如夏月嬰兒患此証為細末薄荷人參湯調下不拘時候

天王散

出全
嬰方

治小兒吐瀉或悞服冷藥脾虛生風成

慢

用南星一箇重八九錢已上取地坑子深三寸炭火

五斤燒通赤入好酒半盞然後以入南星却用炭三兩條蓋却坑子候南星微裂取出剉碎再炒熟為末用半兩天麻一錢麝香一字和拌三歲半錢生薑防風湯調下亦治咳嗽惡心不食

七寶妙砂丹

出活幼口議

治嬰孩小兒慢驚風及慢脾利

疾竒効須以木香佐之其候神情昏睡膈上有虛痰不能得化不可服巴豆輕粉恐動臟腑只將神仙所留妙方與服其痰須臾自下良久神情已定眼目微

開漸與溫平藥調理胃氣兼順理驚風藥與服勿更
攻繫其方乃一文開元通寶銅錢名七寶妙砂丹開元
錢樣

⑤其錢背上下有兩月子只有一箇月子者不用錢色
淡黑小於諸錢將錢頓鉄匙頭於炭火內燒霎時羅
上下各出黃白珠子遍匙都是將出候冷傾放茶盞
中入硃砂末少許只作一服煎金銀薄荷湯送多收
此錢準備緩急或先燒成硃子收拾亦得此方墜下

小兒虛痰別無他者用之乃保十全功效一方用南
木香煎湯送下或人參湯下○調治嬰孩小兒慢驚
風候無過前件藥對証尅効須審慢脾已傳未傳之
理其兒眼開未合尚有慢驚脚手不冷之時未可使
與回陽且與七寶妙砂丹一二服眼合沉困陰証極
盛者方可與服回陽醒脾湯劑手足漸暖仍與觀音
全蝎散兼服凡慢脾風候最為惡証只可前方調治
雖曰病在緊急不得夾襍用藥泛泛為之總屬無益

枉勞其功虛延其候此疾傳陰陽虛陰盛如燈無油
只見次第蛻去若不助陽生胃只知截風去驚兒疾
轉見增重且兒陰証未至十分與藥如太寒涼攻得
陰重虧難以救療也若扶其陽氣隨陰而化所謂制
之於未然醫慢脾風証候如所述用藥由可救活
若鄙夫意見不同難以省活嗟哉

羌活膏

出錢氏方

治脾胃虛肝氣熱盛生風取轉過或吐

瀉後為慢驚者亦治傷寒用無不効

羌活

去蘆頭

川芎

人參

切去蘆頭

白附子

炮

赤

茯苓

去皮各半兩

天麻

一兩

乾蝎

焙去毒

白蠶

酒浸炒黃

方可用

白花蛇

酒浸肉焙乾取用各一錢

川附子

焙去皮臍

防

風

去蘆頭切焙

肉豆蔻

麻黃

去節各二錢

雞舌香

即母

丁香

藿香葉

沉香

木香

各二錢

輕粉

一字

真

珠末

牛黃

各錢半

龍腦

半字

麝香

一錢半

雄黃

一錢

辰硃

一錢已上七味各別研入

右為細末熟蜜和劑旋丸大豆大每服一二丸食前

薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服性溫故也

服不拘時

古今論雞舌香者同異紛紛或以為番棗核或以為母丁香互相排抵竟無定說忠

孝以謂最為易辨所以久無定說者或於其名耳古人論藥多以其形似者名之如烏頭狗脊鶴蟲之類是也番棗核母丁香本二物以其皆似雞舌故名過同况藥物名同實異如金櫻地歸之類不足怪也如雞舌香二種各有主療番棗核者得於乳香中今治瘡疥藥多用之母丁香即丁香之老者極芳烈古人含雞舌者乃此類也今治溫中藥多用之所謂最為易解者

青金丸

一名二神丹
出續易簡方

用青州白丸子金液丹等分同研為細末麪糊和丸

如黍米大量兒大小服二十丸至三十丸薑湯下一
方用泡蒸餅糊為丸如菉豆大溫熱水下未能嚥者
青米飲調服如痰多者加白丸子末瀉多者加金液
丹末証候退即以六神散調補小兒胸膈痰喘吐逆
欲生風者及作泄瀉並皆治之陳米飲下

麝香六神膏

出楊氏家藏方

治小兒慢驚潮作口噤不如手

足癰癰發歇無時

麝香

一字別研

白花蛇頭

一枚酒浸一宿

烏蛇尾

五寸酒浸一宿

全蝎

七枚去毒炒焦

蜈蚣

一條塗酥炙焦

棘剛子

七條去壳取蟲微炒

右件為細末鍊蜜和丸每一兩作四十九丸每服一丸

煎人參麻黃湯化下不拘時候

香蠶散

出楊氏家藏方

治小兒慢驚涎盛口噤昏塞項背強

直手足搐搦進退不定睡卧多驚

白附子

一兩炮

天麻

全蝎

去毒微炒

白殭蠶

炒去絲嘴

天南星

炮裂

人參

去蘆頭

附子

去皮臍各二兩

甘草

炙黃

硃砂

別研

釣鐮

各一錢

腦子

一字別研

麝香

一字別研

右為細末半歲兒每服一字一歲兒服半錢煎荊芥

湯下不拘時

雀瓮散

出楊氏家藏方

治小兒慢驚潮搐口眼相引目睛上

視頭項僵折痰涎壅閉神志昏憤

棘剛子

十枚去蟲微炒

全蝎

三十枚去毒炒

草麻子

二十枚去皮研

石榴

一枚大者去子盛前三味藥在內用黃泥裹作毬慢火煨乾燒赤候聞藥氣透出候全紅

熟取出去泥細研次入沒藥

白殭蠶

炒去絲嘴

天南星

炮

半

夏

湯浸七遍去滑

白附子

炮四味各一分

乳香

一錢別用

右件後四味為細末次入乳香并燒者藥同研勻半
歲兒每服一字一歲兒服半錢煎荊芥薄荷湯入酒
兩三點同調下不拘時候

截驚散

出楊氏家藏方

治小兒慢驚潮搐目瞤斜視口眼牽引

牙關緊急胎風胎瘤悉皆治之

麻黃

去根節
秤一錢

麝香

一錢
別研

烏蛇頭

一枚酒
浸焙乾

蜈

公

一條塗
酥炙焦

全蝎

一錢去
毒微炒

川烏頭

一分炮
去皮臍

右件為細末次入麝香研勻半歲兒每服一字周歲

兒服半錢煎荊芥湯調下不拘時候

加減定命丹

出楊氏家藏方

治小兒慢驚癎瘈目睛斜視身

體強硬昏塞如醉及治胎風成癎發歇不定荏苒經

時

蟾酥

酒浸一宿

牛黃

別研

硃砂

別研

甘草

炙黃

胡黃

連

麝香

別研

使君子

肉

犀角屑

當歸

洗焙

天麻

細松煙墨

燒灰煙盡地上去火毒

羌活

去蘆頭十二味各一

字

全蝎

二枚去毒微炒

棘剛子

五枚去殼取蟲微炒

半夏

湯洗

七通

天南星

牛膽製者

附子

炮去皮臍

虎骨

燕酒酥炙

烏

蛇

酒浸一宿取肉炙乾

乾薑

炮

丁香

沉香

肉桂

去粗

皮

人參

去蘆頭

白茯苓

去皮

肉苳蔻

麴裏煨熟去麴

白朮

已上十三味各一錢

右為細末煮粟米粥和丸如黍米大青黛為衣每服

十丸荊芥湯下不拘時候

桃仁方

出王氏博濟方

治小兒慢驚墜涎安蟲其狀多因久

患脾胃虛弱風邪中入而作此候

綠礬

一兩半

赤脚烏

半兩

右二味同研為細末稠麪糊為丸如菉豆大每服溫米湯下三丸次喫補虛丸

新羅白附子

一兩湯泡去皮

大半夏

一兩

右二味各用白湯浸三日每日換水三度取出焙乾為末以生薑自然汁着兩錢薑末煮糊和為丸如菉豆大每服三丸溫粟米湯飲下

醒脾散

出朱氏焦驗方

治慢驚吐瀉不止

肉豆蔻

檳榔 各一箇

胡椒 二十四粒

茯苓 二錢 木

香藿香

各一錢

右為末每服一錢用水一盞煎溫服

麝香餅子

出楊氏家藏方

治小兒吐瀉之後內虛生風成慢

驚涎潮搐搦頭項反折精神昏困

全蝎

二十一枚每一枚用薄荷二葉裹定先以生薑搗汁浸軟麻黃逐枚以麻黃纏定却煎薑

汁於慢火上炙令麻黃黃色又煎薑汁炙如此三遍焙乾用

乳香 別研

雄黃

別研

白花蛇

酒浸取肉焙乾

天南星

炮裂入生薑汁內浸一宿切焙乾用

烏蛇尾

酒浸取肉

白殭蠶

炒去絲嘴

附子

一枚炮去臍尖取末已上

八味各

三錢

麝香

半錢焙乾

右件為細末次入研者藥和勻別用天南星一兩調

生薑汁煮糊與前藥和丸如梧桐子大捏作餅子略

見日色陰乾每服一餅子煎荊芥湯化下不拘時候

補脾益真散湯

宿州陳氏方

治小兒胎稟怯弱外實裏虛

因嘔吐乳妳糞便青色而成因癰俗曰慢驚風氣逆涎稠眼珠直視四肢抽掣或因變蒸客忤而所作或

因持拖驚嚇而所作或因悞服鎮心寒涼藥而所作
此藥但溫而不燥

木香 當歸去蘆 人參去蘆 黃芪 丁香 訶子

肉 陳皮去瓢 厚朴薑製 甘草 肉豆蔻 草果

茯苓去皮 白朮 官桂不見火 半夏薑製 附子炮已

上一十六
味各半兩 全蝎去毒一枚

右各脩製為咬咀每服三錢重水一盞半生薑一片
肥棗一枚煎至六分去粗稍熱服壯飢時服訖揉動

心腹以助藥力後方可乳食

渴者加茯苓去附子人參丁香甘草肉豆蔻 瀉

者加丁香訶子肉 嘔吐加丁香半夏陳皮 腹

痛加厚朴良薑 腹脹加厚朴丁香前胡枳殼

咳嗽加前胡去附子半夏肉豆蔻官桂草菓 痰

喘加前胡去附子枳實肉豆蔻赤茯苓丁香草菓

氣逆不下加前胡去當歸枳實檳榔附子 惡

風自汗加官桂黃芪 足冷加附子丁香厚朴 上

增藥與正

方分兩同

又方

出百一
選方

用正生大附子去皮臍生為末以白項蚯蚓令於藥末內衮候定刮蚯蚓上附子為丸如黃米大每服十丸溫米飲下

八仙散

傳氏
活嬰

治一切身冷瘈瘲四肢弱吐瀉不食精

神困慢面色青黑不省人事

天麻

一錢熟
湯泡洗

人參

一錢

白朮

一錢

白茯苓

一錢
半

御米

一錢炒
乾油

糯米

薑汁浸
七次

扁豆

一錢炒

陳皮

一錢

蓮肉

去心
一錢

藿香

一錢

甘草

一錢炒

右為細末如常用調氣只用鹽湯下或鹽米飲下如

吐瀉霜梅湯下慢驚者冬瓜仁陳皮煎湯下入鹽少

許不拘時候

羌活勾藤散

傳氏
活嬰

治慢驚風可與宣風散八仙散相

間服

勾藤

二錢

蟬蛻

三錢
洗

防風

三錢

人參

一錢

天麻

一錢

蝎稍

半錢

川芎

一錢

麝香

一字

右為細末每服一錢用薄荷湯調服溫茶清湯亦得

不計時候

普濟方卷三百七十一